

FUCHSIA VERRUCOSA (ONAGRACEAE) PRIMER REGISTRO PARA VENEZUELA

por

HENRY A. RODRIGUEZ-CARRASQUERO (1)

Fuchsia verrucosa Hartweg, descrita por Hartweg en 1845 de Colombia y citada por MUNZ (1943), de los Departamentos de Cundinamarca, Huila y Norte de Santander (Colombia) se reporta por primera vez para Venezuela, extendiéndose el área de distribución de la especie hasta los Andes Venezolanos. Material enviado de Fuchsia al especialista Dr. P. A. Munz (2) para su identificación resultó ser: *F. verrucosa*.

Fuchsia verrucosa Hartweg, in Bentham, Pl. Hartweg. 178. 1845.
Tipo: Hartweg 991 (B); fotos (P, POM) Fig. 1.

Fuchsia perbrevis Johnston, Contr. Gray Herb. 75: 30. 1925
Tipo: Holton 892 (GH)

Material examinado de VENEZUELA: Estado Táchira, "in remnants of subpáramo cloud forest, on very steep hillside, in wet sandy soil of wet quebrada about 9 km. south from crossroad at Portachuelo along Road to El Pregonero, near border with Mérida. Altitude: 2.950 m., 17 February 1973". TILLET & RHT 723-10. Duplicado depositado en el Herbario (MER).

(1) Curador Herbario (MER), Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Los Andes, Mérida, VENEZUELA.

(2) Rancho Santa Ana Botanical Garden, 1500 North College Avenue, Claremont, California 91711, U.S.A.




Figura 1. *Fuchsia verrucosa* Hartweg. - a): Hábito - b): Flor - c): Sección longitudinal de la flor
d): Corte x del ovario - e): Vista superior del pistilo.

BIBLIOGRAFIA

- MUNZ, P.A. A revision of genus *Fuchsia* (*Onagraceae*). California Academy of Sciences 25(1) : 58-59, Fig. 47. 1943.

ABSTRACT

Fuchsia verrucosa is reported for the first time in Venezuela. Its distribution area is extended to the Venezuela Andes.